

Fiche Situation

Protocole d'urgence pour tout enfant qui présente une réaction allergique à l'école

L'élève présente des anomalies pendant ou juste après un repas ou après une piqûre insecte (abeille, guêpe, frelon)

Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d'urgence allergie ainsi qu'un téléphone.

La réaction est GRAVE

L'enfant a du mal à respirer et sa voix change
 Il respire mal, il siffle, il tousse
 Il a très mal au ventre et vomit de façon répétée
 Il devient rouge sur tout le corps et ses mains, ses pieds, son cuir chevelu le démangent
 Il se sent mal ou il fait un malaise

Cela peut être encore plus grave si plusieurs de ces signes sont associés



LES BONS REFLEXES

- 1 – Allonger l'enfant ou le laisser ½ assis en cas de gêne pour respirer
- 2 – Appeler le SAMU (15 ou 112) pour injecter dans la face externe de la cuisse de l'enfant l'adrénaline en auto-injecteur situé dans la trousse d'urgence sur demande du médecin

En attendant les secours une 2^{ème} injection d'adrénaline peut être faite si les symptômes persistent après 5 minutes ou plus

La réaction est MODEREE

Sa bouche pique, ses lèvres gonflent
 Ses yeux piquent, son nez coule
 Des plaques rouges localisées le démangent
 Il a un peu mal au ventre et il a envie de vomir

Mais il parle bien et il respire bien



LES BONS REFLEXES

- 1 – Prévenir les parents et contacter le médecin
- 2 – Surveiller l'enfant jusqu'à la disparition des symptômes

EN L'ABSENCE D'AMELIORATION

J'évalue de nouveau la gravité de la réaction



Dans tous les cas, rester à côté de l'élève et ne pas oublier de tenir la famille informée.


Fiche Technique

Modalités de l'injection de l'adrénaline selon la présentation du produit


ANAPEN




1



2



3



4

10 seconds


Enlever le capuchon noir protecteur de l'aiguille.

Retirer le bouchon noir protecteur.

Appuyer fermement le stylo sur la face extérieure de la cuisse.

Appuyer sur le bouton rouge
Maintenir appuyé 10 secondes.
Puis masser la zone d'injection.

EMERADE





Appuyez




Enlever le capuchon protecteur de l'aiguille.


Placer et appuyer le stylo contre la face externe de la cuisse.
Maintenir le stylo contre la cuisse pendant environ 5 secondes

Masser légèrement le site d'injection.


EPIPEN




1



2



3



4


Enlever la capsule bleue


Placer l'extrémité orange du stylo sur la face extérieure de la cuisse

Appuyer fermement la pointe orange sur la face externe de la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 secondes


Puis masser la zone d'injection

JEXT






90°



10 SECS
CLICK



Enlever le bouchon jaune.

Placer l'extrémité noire du stylo sur la face extérieure de la cuisse.

Appuyer fermement sur la face externe de la la cuisse jusqu'à entendre un déclic et maintenir appuyé pendant 10 secondes.

Puis masser la zone d'injection.